



Grandes Cultures

©, SPV Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation

Service Régional de la
Protection des Végétaux
38, rue Sainte Catherine
54043 NANCY CEDEX
☎ : 03.83.30.41.51
Fax : 03.83.32.00.45

Imprimé à la Station
d'Avertissements Agricoles
de Lorraine

Le Directeur-Gérant :
D. VERBEKE

Publication périodique
C.P.A.P. n° 2011 AD
ISSN n° 0980-8507

Abonnement annuel : 380 F

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

DLP 26-6-98010369

REGION LORRAINE

Bulletin technique n° 17 du 18 juin 1998

Colza

Maladies

Des taches d'*alternaria* sont visibles sur les siliques dans quelques parcelles.

Si les conditions anticycloniques annoncées se maintiennent, le développement de la maladie n'aura plus d'incidence sur le rendement.

Le traitement est inutile trois semaines avant la récolte.

Maïs

Pyrale

La nymphose a débuté aux environs du 10 juin, soit environ une semaine plus tard que l'année précédente.

Il est encore trop tôt pour fixer une date précise des traitements chimiques qui vont dépendre surtout des températures enregistrées durant les prochaines semaines.

La lutte biologique avec des trichogrammes pourrait intervenir en fin de mois ou début du mois de juillet.

Nous rappelons que les secteurs les plus exposés aux attaques de pyrale restent le nord-est l'unévillois jusqu'à Sarrebourg, le sud-ouest vosgien et meusien.

Alternaria :
Progression très limitée.

Pyrale maïs :
Début de la nymphose.

H0Jo
50614

D3



P102